



Инструкция по тестированию кожи на аллергию

Обязательно проверьте все свои лекарства у своего врача или медицинского помощника, когда вы запланировали тест на аллергию.

Чего нельзя:

- Не забывайте принимать безрецептурные антигистаминные препараты, лекарства от простуды или сироп от кашля за 10 дней до обследования. Это включает в себя Бенадрил, Кларитин, Зиртек, Аллегра, Лоратадин, Цетиризин и Фексофенадин, Тавист, Драмамин, Атаракс и другие.
- Не принимайте антигистаминные препараты, отпускаемые по рецепту, за 10 дней до проведения теста, включая кларитин, зиртек, аллегру, лоратадин, цетиризин, фексофенадин и спрей для носа астелин. Также прекратите антигистаминные глазные капли за 10 дней до тестирования.
- Не принимайте бета-блокаторы за 5 дней до тестирования. К ним относятся лабеталол, метопролол, карведилол и их торговая марка эквиваленты.
- Не принимайте противокислотные препараты в течение 48 часов до тестирования, включая Зантак, Пепцид и Тагамет. Вы можете продолжить принимать ингибиторы протонной помпы, такие как Prilosec, Nexium, Prevacid, Protonix и Aciphex.
- Не принимайте никаких снотворных за 48 часов до тестирования, включая Тайленол РМ и Экседрин РМ.

Разрешается:

- Носите что-нибудь удобное, что позволит вам получить доступ к вашей спине или обоим плечам в день тестирования.
- Вы можете продолжать использовать назальные стероидные спреи, такие как Flonase, Nasonex, Nasacort и Rhinocort. Не используйте Астелин.
- Просмотрите список лекарств, которых следует избегать ниже.

Антигистаминные препараты прекратить за 10 дней до тестирования:

Generic:

Acrivastine
Azatadine
Bроpheniramine
Carbinoxamine
Cetirizine
Chloropheniramine
Clemastine
Cупроheptadine
Desloratadine
Diphenhydramine
Fexofenadine
Hydroxyzine
Levocetirizine
Loratadine
Meclizine

Phenindamine
Promethazine
Pyrilamine
Tripolidine

Brand Name:

Semprex
Optimine, Trinalin
AccuHist, Bromfed, Iodrane
Pediox, Cardec
Zyrtec, Zyrtec D
Ah-chew, Aller-Chlor, Atrohist, Chlor-
Amine, Chlor-Trimetron, Deconamine,
Extendryl, Histussin, Hycomine,
Kronofed, Nolamine, Tussi-12, Tussionex,
Tylenol Allergy and Flu Products

Dayhist, Tavist
Periactin
Clarinet, Clarinet D
Dramamine
Benadryl
Allegra, Allegra D
Atarax, Vistaril
Xyzal
Claritin, Claritin D, Alavert
Ativert
Nolahist
Phenergan
Viravan
Actifed, Allecron, Triacin

*** Антигистаминные препараты могут входить в состав лекарств от простуды, морской болезни, тошноты и снотворного.



Глазные капли нужно прекратить за 10 дней до тестирования:

Generic:

Azelastine
Epinastine
Olopatadine
Ketotifen
Levocarbastine
Pheniramine

Brand Name:

Optivar
Elestat
Patanol, Pataday
Zaditor
Livostin
Naphcon-A

Препараты изжоги прекратить за 5 дней до тестирования:

Generic:

Cimetidine
Famotidine
Nizatidine
Ranitidine

Brand Name:

Tagamet
Pepcid
Axid
Zantac

Лекарства от высокого кровяного давления / сердца / мигрени, чтобы прекратить 5 дней до тестирования:

Generic:

Acebutolol
Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Carteolol
Carvedilol
Nadolol
Penbutolol
Pindolol
Propranolol

Brand Name:

Monitan, Sactal
Kerlone
Zebeta, Ziac
Cartrol
Coreg
Corgard
Levatol
Visken
Inderal

Нос спрей прекратить за 10 дней до тестирования:

Generic:

Azelastine

Brand Name:

Astelin

Антидепрессанты / невропатическая боль медикаментозное лечение / наркотические препараты, чтобы прекратить 5 дней перед тестированием:

Generic:

Amitriptyline
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Nortriptyline
Protriptyline
Tripramine

Brand Name:

Elavil, Vanatrip
Norpramine
Sinequan
Tofranil
Aventyl, Pamelor
Vivactil
Surmontil