



## Instrucciones de prueba de alergia en la piel

Asegúrese de revisar todos sus medicamentos con su médico o el asistente médico cuando esté programado para su prueba de alergia

### NO HACER:

- Tenga en cuenta tomar antihistamínicos de venta libre, medicamentos para el resfriado o jarabe para la tos durante 10 días antes de la prueba. Esto incluye Benadryl, Claritin, Zyrtec, Allegra, loratadina, cetirizina y fexofenadina, Tavist, Dramamine, Atarax y otros.
- No tome antihistamínicos recetados durante 10 días antes de la prueba, incluidos Claritin, Zyrtec, Allegra, loratadina, cetirizina, fexofenadina y aerosol nasal de Astelin. También detenga las gotas para los ojos antihistamínicos 10 días antes de la prueba.
- No tome betabloqueantes 5 días antes de la prueba. Estos incluyen labetalol, metoprolol, carvedilol y su marca equivalentes
- No tome medicamentos antiácidos durante 48 horas antes de la prueba, incluidos Zantac, Pepcid y Tagamet. Puedes continuar tomar inhibidores de la bomba de protones como Prilosec, Nexium, Prevacid, Protonix y Aciphex.
- No tome ningún medicamento para dormir durante 48 horas antes de la prueba, incluidos Tylenol PM y Excedrin PM.

### HACER:

- Use algo cómodo que permita el acceso a su espalda o ambos brazos el día de la prueba.
- Puede continuar usando aerosoles nasales con esteroides como Flonase, Nasonex, Nasacort y Rhinocort. No use Astelin.
- Revise la lista de medicamentos que deben evitarse a continuación.

### Antihistamínicos para detener 10 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Acrivastine	Semprex
Azatadine	Optimine, Trinalin
Bropheniramine	AccuHist, Bromfed, Iodrane
Carbinoxamine	Pediox, Cardec
Cetirizine	Zyrtec, Zyrtec D
Chlorpheniramine	Ah-chew, Aller-Chlor, Atrohist, Chlor-Amine, Chlor-Trimetron, Deconamine, Extendryl, Histussin, Hycomine, Kronofed, Nolamine, Tussi-12, Tussionex, Tylenol Allergy and Flu Products
Clemastine	Dayhist, Tavist
Cyproheptadine	Periactin
Desloratadine	Clarinex, Clarinex D
Dimenhydrinate	Dramamine
Diphenhydramine	Benadryl
Fexofenadine	Allegra, Allegra D
Hydroxyzine	Atarax, Vistaril
Levocetirizine	Xyzal
Loratadine	Claritin, Claritin D, Alavert
Meclizine	Ativert
Phenindamine	Nolahist
Promethazine	Phenergan
Pyrilamine	Viravan
Tripolidine	Actifed, Allecron, Triacin

\*\*\*\*\* Los antihistamínicos pueden ser ingredientes en medicamentos para el resfriado, el mareo, las náuseas y el sueño.



Gotas para los ojos para parar 10 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Azelastine	Optivar
Epinastine	Elestat
Olopatadine	Patanol, Pataday
Ketotifen	Zaditor
Levocarbastine	Livostin
Pheniramine	Naphcon-A

Medicamentos para la acidez estomacal que se suspenden 5 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Cimetidine	Tagamet
Famotidine	Pepcid
Nizatidine	Axid
Ranitidine	Zantac

Medicamentos para la presión arterial alta / corazón / migraña para suspender 5 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Acebutolol	Monitan, Sectral
Atenolol	Tenoretic, Tenormin
Betaxolol	Kerlone
Bisoprolol	Zebeta, Ziac
Carteolol	Cartrol
Carvedilol	Coreg
Nadolol	Corgard
Penbutolol	Levatol
Pindolol	Visken
Propranolol	Inderal

Spray nasal para parar 10 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Azelastine	Astelin

Antidepresivos / dolor neuropático medicamentos / narcolepsia para detener 5 días antes de la prueba:

<b>Generic:</b>	<b>Brand Name:</b>
Amitriptyline	Elavil, Vanatrip
Desipramine	Norpramine
Doxepin	Sinequan
Imipramine	Tofranil
Nortriptyline	Aventyl, Pamelor
Protriptyline	Vivactil
Tripramine	Surmontil